

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES




## Grandes Cultures

Bulletin Technique n° 01 du 08 Février 2006 - 2 pages


### COLZA : stade C1

#### Larves

#### Rappels sur le vol d'adultes de l'automne 2005



PROCHAIN BULLE-  
TIN SELON L'AC-  
TUALITE



### COLZA

Altises :  
Situation contras-  
tée

### BLE

Piétin verse :  
Risque climatique  
très faible

Avec **327 captures**, le vol peut être qualifié de **moyen** et arrive en sixième position dans le concert des 16 dernières années. Il **s'est étalé** sur un mois entre le **15 septembre** et le **15 octobre**.

Le **Top Avertissements Agricoles** a été donné autour du **10 octobre** ; les femelles arrivant immatures sur les parcelles avec une maturation sexuelle de trois semaines pour devenir aptes à pondre.

## Résultats des sondages larvaires de janvier 2006

Sur **25 parcelles** sondées, **18 sont indemnes** et correspondent à des parcelles traitées à la date précitée. 2 parcelles sont à **2 %** de pieds atteints et avaient également été protégées à la date conseillée.

Sur les **5 parcelles non traitées**, l'attaque concerne de **9 à 32 % des pieds**.

*Nous attirons votre attention sur le fait qu'il n'existe **plus d'alternative** de rattrapage **sur larves** ; un argument supplémentaire pour assurer correctement votre intervention sur adultes à l'automne, si nécessaire.*

## Charançons de la tige

**Le vol n'a pas débuté** et les conditions climatiques actuelles ne sont pas favorables à sa réalisation.

Quoiqu'il en soit, la **somme des températures** depuis la mue imaginale (juin) est **suffisante** pour que l'**émergence** puis le **vol** se **formalisent** dès l'arrivée des conditions climatiques adéquates.

*Pour ces raisons, il est impératif de **mettre les cuvettes jaunes en place**. Consulter votre dossier Avertel pour tout savoir sur le charançon de la tige en Poitou-Charentes.*

**BLE :** Stade 4 feuilles à mi-tallage

## Piétin-verse

Même pour des levées d'octobre à début novembre, le **risque climatique est très faible à ce jour**, conséquence logique des conditions climatiques : pluies assez faibles (environ 50 % de la Normale) et concentrées sur de courtes périodes, températures nettement en retrait par rapport aux Normales avec un déficit de 1,4 °C pour la température moyenne quotidienne depuis le 10 novembre.

Avec seulement 4 contaminations primaires et **aucune contamination secondaire** à ce jour, ce risque climatique est le plus bas depuis une douzaine d'années.

Des indications complémentaires seront communiquées dans quelques semaines.

## TOUTES CULTURES

### Campagnols des champs

En **Deux Sèvres**, les observations d'hiver ont mis en évidence des densités moyennes de **100 à 150 animaux par ha** dans les cultures fourragères (ray-grass, luzerne, prairies de plus de 2 ans) et les refuges (bermes, jachères, repousses).

La période de froid a normalement ralenti le développement de la population relativement jeune (elle comprenait 50 % d'animaux de moins de 30 jours mi-janvier). Cependant des **foyers actifs** sont signalés dans les colzas et de nombreux indices de présence sont notés dans les cultures fourragères, ray-grass et bermes.

*Il conviendra de **rester vigilant** à la reprise de végétation et après les premières fauches.*